

Плодовые и ягодные культуры

Обработка семян		Обработка в период вегетации		
Приготовление рабочего раствора	Расход рабочего раствора	Приготовление рабочего раствора	Расход рабочего раствора	Фазы опрыскивания
Яблоня, груша, вишня, слива, персик, абрикос, айва				
150-200 мл РЕФИТОН +20 л воды	20 л на 1000 черенков	1100 мл РЕФИТОН на 800-1000* л воды	800-1000* л на 1 га	<ul style="list-style-type: none"> Через 5-7 дней после цветения. Начало физиологического опадания завязей. Период закладки цветочных почек. Период интенсивного роста плодов.
Цитрусовые				
150-200 мл РЕФИТОН +20 л воды	20 л на 1000 черенков	1100 мл РЕФИТОН на 800-1000* л воды	800-1000* л на 1 га	<ul style="list-style-type: none"> Через 7-10 дней после цветения. Начало опадания завязей. Через 15 дней после второго. Через 15 дней после третьего.
Малина, смородина, жимолость, крыжовник				
150-200 мл РЕФИТОН +20 л воды	20 л на 1000 черенков	1100 мл РЕФИТОН на 800-1000* л воды	800-1000* л на 1 га	<ul style="list-style-type: none"> Фаза бутонизации. Фаза цветения. Фаза налива ягод.
Виноград				
150-200 мл РЕФИТОН +20 л воды	20 л на 1000 черенков	1100 мл РЕФИТОН на 800-1000* л воды	800-1000* л на 1 га	<ul style="list-style-type: none"> Фаза бутонизации. Фаза цветения. Фаза налива ягод.
Земляника				
		400 мл РЕФИТОН на 50-300* л воды	50-300* л на 1 га	<ul style="list-style-type: none"> Фаза начала роста весной. Через 15 дней после первой. Через 15 дней после второй.

* — в зависимости от вида опрыскивателя